

Wir schützen
Ihre Gesundheit.



Dr. Schumacher

Spenderplatzierung auf Normalstationen

Bei 40 % der Normalstationen fehlen Händedesinfektionsmittel am Point-of-Care [1].
Das lässt sich leicht ändern, z. B. mit einem Spender je zwei Betten in Patientenzimmern.



4 Tipps zur Spenderplatzierung

Perspektive des Personals in den Fokus stellen:

Spender sollte während einer Versorgung immer zu sehen sein [2].

Eine Armlänge Abstand:

Das Personal soll sich während der Tätigkeit nicht zum Spender bewegen müssen [3].

Funktionalität gewährleisten:

Regelmäßige Kontrolle der Bedienung sowie des Datums und Füllstands des Händedesinfektionsmittels [4].

Spender am Patientenbett:

Auf der Normalstation sollte mindestens ein Spender je zwei Betten am Fußende des Patientenbettes angebracht sein [3].

Quellen:

1. Azim S et al. (2016). *American Journal of Infection Control*; 44 (7):772-776
2. Birnbach, D. J. et al. (2010). *Quality and Safety in Health Care*; 19:462-465
3. World Health Organization & WHO Patient Safety. (2009). *WHO guidelines on hand hygiene in health care*.
4. Kohan C et al. (2002). *American Journal of Infection Control*; 30:373-375

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld

Postanschrift:
Postfach 11 62
34201 Melsungen

T +49 5664 9496-0
F +49 5664 8444
info@schumacher-online.com
www.schumacher-online.com



Dr. Schumacher