

Wir schützen  
Ihre Gesundheit.



Dr. Schumacher

# Spenderplatzierung in OP-Bereichen

Mit nur 18 % Compliance bei der hygienischen Händedesinfektion in der Anästhesie, ist eine bessere Platzierung von Desinfektionsmitteln im OP dringend zu empfehlen [1].



## 3 Tipps zur Spenderplatzierung

### Perspektive des Personals in den Fokus stellen:

Spender sollte während einer Versorgung immer zu sehen sein [2].

### Eine Armlänge Abstand:

Das Personal soll sich während der Tätigkeit nicht zum Spender bewegen müssen [3].

### Funktionalität gewährleisten:

Regelmäßige Kontrolle der Bedienung sowie des Datums und Füllstands des Händedesinfektionsmittels [4].



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH  
Am Roggenfeld 3  
34323 Malsfeld

Postanschrift:  
Postfach 11 62  
34201 Melsungen

T +49 5664 9496-0  
F +49 5664 8444  
info@schumacher-online.com  
www.schumacher-online.com

### Quellen:

1. Biddle C, Shah J. (2012). *American Journal of Infection Control*; 8:756-759
2. Birnbach, D. J. et al. (2010). *Quality and Safety in Health Care*; 19:462-465
3. World Health Organization & WHO Patient Safety. (2009). *WHO guidelines on hand hygiene in health care*.
4. Kohan C et al. (2002). *American Journal of Infection Control*; 30:373-375