



Desinfektionsplan für Kindereinrichtungen

Hände und Haut

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 <p>Haut/Hände Desinfektion</p>	Händedesinfektion hygienisch	<ul style="list-style-type: none"> • Vor dem Umgang mit Lebensmitteln. • Nach Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut und anderen Körperausscheidungen (z. B. nach dem Windeln, nach der Begleitung von Kindern bei der Toiletten-, Töpfchenbenutzung), auch wenn Schutzhandschuhe getragen wurden. • Vor dem Kontakt mit Wunden (z. B. vor dem Anlegen von Pflastern, Verbänden o. ä.). • Nach der Versorgung von Kindern mit Durchfall, Erbrechen oder Atemwegsinfekten. • Nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen. • Bei erhöhter Infektionsgefahr mehrmals täglich. • Ggf. nach dem Naseputzen. • Ggf. nach dem Toilettenbesuch. • Bei Bedarf (z. B. bei Arbeitsbeginn). 	<input type="checkbox"/> ASEPTOMAN® MED <input type="checkbox"/> _____	konz. 30 Sekunden	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitende
 <p>Haut/Hände Pflege & Reinigung</p>	Hautschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Vor Arbeitsbeginn. • Vor hautbelastenden Tätigkeiten • Nach dem Händewaschen. 	<input type="checkbox"/> DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM <input type="checkbox"/> _____		Hautschutzcreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Dabei kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeitende
	Hände-/Hautpflege	<ul style="list-style-type: none"> • Am Arbeitsende. 	<input type="checkbox"/> DESCOLIND PURE INTENSIVE CREAM <input type="checkbox"/> _____		Hautpflegecreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Dabei kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeitende
	Händewaschung	<ul style="list-style-type: none"> • Zu Arbeitsbeginn. • Bei sichtbarer Verschmutzung (z. B. nach dem Spielen mit Sand oder Erde). • Nach der Toilettenbenutzung. • Nach Tierkontakt. • Bei Bedarf (z. B. am Arbeitsende). 	<input type="checkbox"/> DESCOLIND PURE WASH <input type="checkbox"/> _____		Waschlotion aus dem Spender mit lauwarmem Wasser aufschäumen. Hände gründlich abspülen und sorgfältig mit weichen Einmalhandtüchern abtrocknen. Dabei besonders die Fingerzwischenräume beachten.	Alle Mitarbeitende

Desinfektionsplan für Kindereinrichtungen

Fläche



Fläche

Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Fieberthermometer	• Direkt nach Gebrauch.	<input type="checkbox"/> DESCOSEPT SENSITIVE WIPES <input type="checkbox"/> _____	3 Minuten	Mit Desinfektionsmittel getränktem Einmaltuch vollständig abwischen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende
Spielzeug	• Nach Verschmutzung mit (potenziell) infektiösem Material, z. B. mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem.	<input type="checkbox"/> DESCOSEPT SENSITIVE WIPES <input type="checkbox"/> _____	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Alle Mitarbeitende
Wickeltischauflage	• Direkt nach Gebrauch.	<input type="checkbox"/> DESCOSEPT SENSITIVE WIPES <input type="checkbox"/> _____	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende
Toilette, Waschbecken	• Nach Verschmutzung mit (potenziell) infektiösem Material, z. B. mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem.	<input type="checkbox"/> DESCOSEPT SENSITIVE WIPES <input type="checkbox"/> _____	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende
Große Flächen z. B. Fußböden, Arbeitsflächen, Sanitärbereich	• Nach Verschmutzung mit (potenziell) infektiösem Material, z. B. mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem.	<input type="checkbox"/> OPTISAL® PLUS <input type="checkbox"/> ULTRASOL® ACTIVE <input type="checkbox"/> _____	1 % – 60 Minuten 2,0 % - 15 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende ¹

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

Desinfektionsplan für Kindereinrichtungen

Sonstiges

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Sonstiges	Arbeitskleidung	• Sofortiger Wechsel nach Kontamination.	Desinfizierendes Waschverfahren		Maschinelle Aufbereitung bei mind. 65 °C.	Alle Mitarbeitende
	Reinigungs- und desinfektionsmittelbeständige Handschuhe	• Bei Desinfektions- und Reinigungsarbeiten.	Schutzhandschuhe geprüft nach DIN EN 420 und DIN EN 374		Handschuhe nur auf trockenen, sauberen Händen tragen. Bei Tragezeiten über 10 Minuten möglichst Baumwollhandschuhe unterziehen. Nach dem Ablegen der Handschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen.	Alle Mitarbeitende
	Chemikalienbeständige Handschuhe	• Beim Umgang mit Konzentraten von Flächendesinfektions-, oder Reinigungsmitteln.	Schutzhandschuhe geprüft nach DIN EN 420 und DIN EN 374		Handschuhe nur auf trockenen, sauberen Händen tragen. Bei Tragezeiten über 10 Minuten möglichst Baumwollhandschuhe unterziehen. Nach dem Ablegen der Handschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen.	Alle Mitarbeitende
	Unsterile Schutzhandschuhe	• Bei möglichem Kontakt mit Blut, Erbrochenem oder Ausscheidungen. Bei möglichem Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material.	Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch (geprüft nach DIN EN 455 Teile 1 bis 4)		Handschuhe nur auf trockenen, sauberen Händen tragen. Bei Tragezeiten über 10 Minuten möglichst Baumwollhandschuhe unterziehen. Nach dem Ablegen der Handschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen.	Alle Mitarbeitende

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im ECO WIPES Spendersystem eingesetzt werden. Die Gebrauchslösung von ULTRASOL ACTIVE ist nach Ansetzen maximal 24 Stunden zu verwenden. Dies ist auch in der Kombination mit Vliestuch-Spendersystemen einzuhalten. Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Stempel / Unterschrift